表2　平成20年3月30日現在のHIV感染者及びエイズ患者の国籍別、性別、感染経路別報告数の累計

診断区分	感染経路	日本国籍			外国国籍			合計		
		男	女	計	男	女	計	男	女	計
HIV感染者	合計	6,796	628	7,424	939	1,280	2,219	7,735	1,908	9,643
	異性間の性的接触	1,703	510	2,213	313	743	1,056	2,016	1,253	3,269
	同性間の性的接触＊1	4,316	3	4,319	271	1	272	4,587	4	4,591
	静注薬物濫用	21	1	22	20	3	23	41	4	45
	母子感染	13	8	21	4	7	11	17	15	32
	その他＊2	128	31	159	31	19	50	159	50	209
	不明	615	75	690	300	507	807	915	582	1,497
エイズ患者	合計＊3	3,328	246	3,574	654	316	970	3,982	562	4,544
	異性間の性的接触	1,317	160	1,477	228	172	400	1,545	332	1,877
	同性間の性的接触＊1	1,243	2	1,245	95	2	97	1,338	4	1,342
	静注薬物濫用	12	3	15	19	0	19	31	3	34
	母子感染	9	3	12	1	4	5	10	7	17
	その他＊2	82	16	98	21	10	31	103	26	129
	不明	665	62	727	290	128	418	955	190	1,145
凝固因子製剤による感染者＊4		1,420	18	1,438	－	－	－	1,420	18	1,438

＊1　両性間性的接触を含む。
＊2　輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。
＊3　平成11年3月31日までの病状変化によるエイズ患者報告数154件を含む。
＊4　「血液凝固異常症全国調査」による2007年5月31日現在の凝固因子製剤による感染者数

※死亡者報告数

感染症法施行後の任意報告数（平成11年4月1日～平成20年3月31日）	258 名
エイズ予防法＊5に基づく法定報告数（平成元年2月17日～平成11年3月31日）	596 名
凝固因子製剤による感染者の累積死亡者数＊6	624 名

＊5　エイズ予防法第5条に基づき、血液凝固因子製剤による感染者を除く。
＊6　「血液凝固異常症全国調査」による2007年5月31日現在の報告数